Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten

Jägerprüfung in Bayern

Fragenkatalog zum schriftlichen Teil

Sachgebiet 4

Inhaltsverzeichnis

4. Sachgebiet 3

4.1 Bejagungsrichtlinien 3
4.1.1 Begriffe und Grundlagen der Bejagung 3
4.1.1.1 Begriffe und Grundlagen der Bejagung allgemein 3
4.1.1.2 Alters- und Güteklassen 3
4.1.2 Abschussplanung 4
4.1.2.1 Zuwachsberechnung und Geschlechterverhältnis 4
4.1.2.2 Abschussaufteilung 5

4.2 Beurteilung und Behandlung des Wildbrets 6
4.2.1 Anatomie 6
4.2.2 Beurteilung erlegten Wildes 7
4.2.2.1 Altersmerkmale und Merkmale der Geschlechter 7
4.2.2.2 Genusstauglichkeit, Qualität 8
4.2.3 Behandlung 9
4.2.3.1 Schalenwild 9
4.2.3.2 Sonstiges Wild 11

4.3 Jagdliche Praxis 12
4.3.1 Jagdarten 12
4.3.1.1 Jagdarten allgemein 12
4.3.1.2 Lockjagd 13
4.3.1.3 Gesellschaftsjagden 14
4.3.1.4 Auf bestimmte Wildarten bezogene Jagdarten 15
4.3.1.5 Fallenjagd 17
4.3.2 Jagdausübung 17
4.3.2.1 Wildverhalten 17
4.3.2.2 Jagdausübungsregeln 18
4.3.2.3 Jagdausübung bis zum Schuss 18
4.3.2.4 Jagdausübung nach dem Schuss 21

4.4 Reviereinrichtungen 28

4.5 Hege 29
4.5.1 Hege allgemein 29
4.5.2 Nahrungsbedarf und natürliche Äsung 30
4.5.3 Verbesserung der Lebensgrundlagen des Wildes 30
4.5.3.1 Verbesserung der Lebensgrundlagen allgemein 30
4.5.3.2 Verbesserung von Deckung und Äsung 32
4.5.4 Nahrungsergänzung 37
4.5.4.1 Salzlecken 37
4.5.4.2 Schalenwildfütterung 37
4.5.4.3 Niederwildfütterung 38

4.6 Wildkrankheiten 40
4.6.1 Kenntnis der Krankheiten 40
4.6.1.1 Kenntnis der Krankheiten allgemein 40
4.6.1.2 Seuchen bei Wild- und Haustieren 41
4.6.1.3 Parasiten 42
4.6.1.4 Viruserkrankungen 44
4.6.2 Erkennen der Krankheiten 45
4.6.2.1 Parasiten 45
4.6.3 Bekämpfen von Wildkrankheiten 46

4. Sachgebiet

4.1 Bejagungsrichtlinien

4.1.1 Begriffe und Grundlagen der Bejagung

4.1.1.1 Begriffe und Grundlagen der Bejagung allgemein

1.

Was versteht man unter Wechselwild?

- [ ] a) Wild, das innerhalb eines Reviers vom Einstand zur Äsung wechselt
- [X] b) Wild, das während der Jagdzeit nicht ständig im Revier steht
- [ ] c) Wild, das sein Haarkleid wechselt

2.

Zu welchen der nachgenannten Folgen kann Überhege beim Schalenwild führen?

- [X] a) Vermehrte Wildschäden
- [X] b) Zunahme von Wildkrankheiten
- [ ] c) Stärkere Trophäen
- [ ] d) Abnahme der Jungwildverluste
- [X] e) Schlechtere körperliche Verfassung

4.1.1.2 Alters- und Güteklassen

3.

Ein 4-jähriger Rothirsch zeigt auf der rechten Stange einen Kronenzehner, die linke Stange ist über dem Augsprosse sichtbar abgebrochen. Ist der Abschuss dieses Hirsches allein wegen der abgebrochenen Stange notwendig?

- [ ] a) Ja
- [X] b) Nein

4.

Ist ein junger Hirsch allein wegen seiner stumpfen, dunklen (brandigen) Enden abschussnotwendig?

- [ ] a) Ja
- [X] b) Nein

5.

Welcher Altersklasse gehört ein 2- bis 3-jähriger Rehbock an?

- [ ] a) Jugendklasse
- [X] b) Mittlere Altersklasse
- [ ] c) Obere Altersklasse

6.

Welches Mindestalter muss ein Gamsbock haben, um zur oberen Altersklasse zu gehören?

- [ ] a) 10 Jahre
- [X] b) 8 Jahre
- [ ] c) 6 Jahre

7.

Wie alt muss ein Rothirsch mindestens sein, um zur Klasse I zu gehören?

- [ ] a) 4 Jahre
- [ ] b) 7 Jahre
- [X] c) 10 Jahre

8.

Die Richtlinien für die Hege und Bejagung des Schalenwildes in Bayern unterscheiden beim Altersaufbau des Schalenwildes den Zuwachs und drei Altersklassen. Welche nachgenannten Stücke des Schalenwildes gehören zur Jugendklasse?

- [ ] a) 2-jähriger Rehbock
- [X] b) 2-jähriger Rothirsch
- [X] c) Schmalreh
- [ ] d) Rotwildkalb

9.

Zu welcher der nachgenannten Klassen des Rotwildes gehört ein 3-jähriger Achter?

- [X] a) III
- [ ] b) II a
- [ ] c) II b

4.1.2 Abschussplanung

4.1.2.1 Zuwachsberechnung und Geschlechterverhältnis

10.

Bei welcher der nachgenannten Wildarten kann nach den Richtlinien für die Hege und Bejagung des Schalenwildes in Bayern – bei sonst angemessenem Wildbestand – der Anteil des weiblichen Wildes höher sein als der des männlichen?

- [X] a) Gamswild
- [ ] b) Rehwild
- [ ] c) Damwild

11.

Warum ist die Zuwachsrate beim Gamswild im Hochgebirge geringer als bei anderen Schalenwildarten?

- [X] a) Späte Geschlechtsreife
- [X] b) Witterungsbedingte Verluste
- [ ] c) Intensive Sonneneinstrahlung (UV-Faktor)

12.

In welchem der nachgenannten Rahmensätze ist nach den Richtlinien für die Hege und Bejagung des Schalenwildes in Bayern der Zuwachs beim Rotwild anzusetzen?

- [ ] a) 50 - 60 % der Alttiere
- [X] b) 70 - 90 % der Alttiere
- [ ] c) 100 - 110 % der Alttiere

13.

Der jährliche Zuwachs beim Schwarzwild unterliegt starken Schwankungen. Welche der nachgenannten Einflussfaktoren wirken sich zuwachsmindernd aus?

- [X] a) Schneereiche und lange Winter
- [ ] b) Trockenes Frühjahr
- [X] c) Fehlende Eichen-, Buchenmast
- [ ] d) Heiße Sommer

4.1.2.2 Abschussaufteilung

14.

Wie hoch sollte der Streckenanteil an Frischlingen beim Schwarzwild sein?

- [ ] a) Ca. 30 %
- [ ] b) Ca. 50 %
- [X] c) Ca. 70 %

4.2 Beurteilung und Behandlung des Wildbrets

4.2.1 Anatomie

15.

Welche der nachgenannten inneren Organe des Rotwildes liegen in der Kammer?

- [ ] a) Nieren
- [X] b) Lunge
- [ ] c) Milz
- [ ] d) Leber
- [X] e) Herz

16.

Welche der nachgenannten inneren Organe des Rehes liegen zwischen dem Zwerchfell und dem Schloß?

- [ ] a) Lunge
- [X] b) Leber
- [X] c) Milz
- [X] d) Nieren
- [ ] e) Herz

17.

Welche der nachgenannten Wildarten haben eine Gallenblase, die vor der Verwertung des Aufbruchs (Geräusch) von der Leber getrennt werden soll?

- [ ] a) Reh
- [X] b) Hase
- [ ] c) Damwild
- [X] d) Schwarzwild
- [X] e) Gams

18.

Mit welchem Organ ist die bei einigen Wildarten vorhandene Gallenblase verwachsen?

- [ ] a) Milz
- [ ] b) Bauchspeicheldrüse
- [X] c) Leber

19.

Zum sogenannten kleinen Jägerrecht gehört die Milz. Mit welchem Organ ist die Milz verbunden?

- [X] a) Magen
- [ ] b) Leber
- [ ] c) Zwerchfell

4.2.2 Beurteilung erlegten Wildes

4.2.2.1 Altersmerkmale und Merkmale der Geschlechter

20.

Bei welchen der nachgenannten Wildtiere kann das Alter der erlegten Stücke an der Trophäe wesentlich besser festgestellt werden als an der Zahnabnutzung?

- [ ] a) Rothirsch
- [ ] b) Damhirsch
- [X] c) Muffelwidder
- [X] d) Gamsbock
- [X] e) Steinbock
- [ ] f) Rehbock

21.

Bei welcher Wildart ist das Stroh´sche Zeichen Hilfsmittel für die Altersschätzung?

- [X] a) Feldhase
- [X] b) Schneehase
- [ ] c) Marder
- [ ] d) Murmeltier

22.

Woran kann bei einem erlegten Fasanenhahn der ältere Hahn von einem im ersten Lebensjahr stehenden Hahn unterschieden werden?

- [X] a) Am Sporn
- [ ] b) An der Farbe des Ständers
- [ ] c) Am Schnabel

23.

Welche Latschen-(Ruder-)farbe haben die im ersten Lebensjahr stehenden Stockenten?

- [ ] a) Orange-rot
- [X] b) Fahlgelb

24.

Woran lassen sich bei erlegten Stockenten die Erpel im Schlichtkleid von den Enten sicher unterscheiden?

- [ ] a) An der Größe
- [X] b) Am Schnabel
- [ ] c) An den Latschen

25.

Wo befindet sich das Stroh´sche Zeichen?

- [ ] a) An den Löffeln des Wildkaninchens
- [X] b) An den Vorderläufen des Feldhasen
- [ ] c) An den Hinterläufen des Rehbockes

26.

Steht ein Rebhuhn, das graue Ständer hat, im ersten Lebensjahr oder ist es älter?

- [ ] a) Es steht im ersten Lebensjahr
- [X] b) Es ist älter

4.2.2.2 Genusstauglichkeit, Qualität

27.

Welche der nachgenannten Merkmale zeigen an, dass ein Stück Schalenwild verhitzt ist?

- [X] a) Verfärbung des Wildbrets
- [ ] b) Nasses Haarkleid
- [X] c) Süßlich fauler Geruch
- [ ] d) Totenstarre

28.

Hat ein Rachenbremsenbefall beim Rehwild einen Einfluss auf die Genusstauglichkeit des Wildbrets?

- [ ] a) Ja
- [X] b) Nein

29.

Welcher Fuchsbalg erzielt einen höheren Verkaufserlös?

- [ ] a) Ein grünlederiger Balg
- [X] b) Ein weißlederiger Balg

30.

Was ist unter verhitztem (stickig gereift) Wild zu verstehen?

- [ ] a) Wild, das in großer Hitze zur Strecke kam
- [ ] b) Wild, das nach einer Hetze zur Strecke kam
- [X] c) Wild, dessen Fleisch (Wildbret) für den Verzehr gesundheitlich bedenklich erscheint, weil es nicht richtig auskühlen konnte

---

31.

Welche der nachgenannten Ursachen kann zum Verhitzen (stickig gereift) von Wildbret führen?

[X] a) Mangelhafte Auskühlung des Wildbrets

[ ] b) Unsauberes Arbeiten beim Aufbrechen und Versorgen

[ ] c) Befall mit Schimmelpilzen

32.

Darf das Wildbret einer Rehgeiß ohne amtliche Fleischuntersuchung zum eigenen Verbrauch verwendet werden, wenn Sie beim Aufbrechen Lungenwurmbefall feststellen, ansonsten jedoch keine Organveränderungen vorhanden sind und die Geiß Normalgewicht hat?

[X] a) Ja

[ ] b) Nein

33.

Darf ein Dachskern, der keine bedenklichen Merkmale aufweist, vom Menschen verzehrt werden?

[ ] a) Er darf ohne Einschränkung verzehrt werden

[X] b) Er darf nur nach durchgeführter Trichinenuntersuchung verzehrt werden

[ ] c) Er darf in keinem Fall verzehrt werden

34.

Beeinträchtigt ein starker Zeckenbefall bei erlegtem Rehwild die Qualität des Wildbrets?

[ ] a) Ja

[X] b) Nein

4.2.3 Behandlung

4.2.3.1 Schalenwild

35.

Ist es an Frosttagen ebenso wie an heißen Sommertagen notwendig, ein Stück Schalenwild nach der Erlegung alsbald aufzubrechen?

[X] a) Ja

[ ] b) Nein

36.

Bei welchen der nachgenannten Wildarten muss man einen Drosselschnitt machen, falls man sie beim Aufbrechen nur bis zur Brustspitze aufschärft?

- [ ] a) Hase
- [X] b) Reh
- [X] c) Gams
- [X] d) Rotwild
- [ ] e) Schwarzwild

37.

Wann wird zweckmäßigerweise nach dem Erlegen eines Gamsbockes der Bart gerupft?

- [X] a) Vor dem Aufbrechen
- [ ] b) Nach dem Aufbrechen
- [ ] c) Nach der Lieferung zu Hause

38.

Sie wollen eine Sauschwarte präparieren lassen. Wie müssen Sie die Sauschwarte behandeln, damit sie bis zum Gerben keinen Schaden leidet?

- [X] a) Einsalzen oder Trocknen
- [ ] b) Unverzüglich in einen Plastiksack verpacken
- [ ] c) In sauberes Wasser einlegen

39.

Womit ist nach den heutigen Erkenntnissen über Wildbrethygiene eine durch einen Weidwundschuss verunreinigte Bauchhöhle eines Stückes Rehwild zu säubern?

- [X] a) Mit sauberem Wasser (Trinkwasserqualität)
- [ ] b) Mit Gras oder Moos
- [ ] c) Mit Schweiß aus der Bauchhöhle

40.

Wenn man beim Aufbrechen eines Stückes Schalenwild nur bis zur Brustspitze aufschärft, muss man bei Wiederkäuern den Schlund abschärfen und verknoten. Von welchem Körperteil ist der Schlund zu trennen?

- [ ] a) Vom Lecker
- [X] b) Von der Drossel
- [ ] c) Vom Pansen

4.2.3.2 Sonstiges Wild

41.

Was sollen Schützen oder Treiber, die einen erlegten Hasen aufnehmen, sofort mit dem Hasen tun?

- [X] a) Blase ausdrücken
- [ ] b) Zur Strecke legen
- [ ] c) Alter feststellen

42.

Warum werden frisch erlegte Hasen im Wildwagen an Stangen nebeneinander gehängt und nicht aufeinandergelegt?

- [X] a) Damit sie auskühlen
- [ ] b) Um den Balg nicht zu entwerten
- [ ] c) Um die Strecke zu präsentieren

43.

Warum wird Federwild aufgebrochen und nicht wie früher ausgehakelt?

- [ ] a) Weil durch Abreißen des Kropfes Verdauungsflüssigkeit austritt, die das umgebende Wildbret verdirbt
- [X] b) Weil der Darm vom Magen abgerissen wird und dabei Magen-Darm-Inhalt in die Bauchhöhle gelangt
- [ ] c) Weil die Gallenblase verletzt wird und die Galle in die Bauchhöhle gelangt

---

44.

Wie sollen Wildenten bei einer Entenjagd im September über mehrere Stunden mitgetragen werden?

- [ ] a) Im Rucksack
- [ ] b) Im Plastiksack
- [X] c) Am Federwildgalgen

4.3 Jagdliche Praxis

4.3.1 Jagdarten

4.3.1.1 Jagdarten allgemein

45.

Schwarzwild lässt sich an der Kirrung erfolgreich bejagen. Wie soll die Kirrung betrieben werden?

- [X] a) An wenigen gut bejagbaren Plätzen geringe Mengen artgerechtes Kirrmaterial anbieten
- [ ] b) Möglichst viele Kirrplätze zum häufigen Wechsel der Ansitzmöglichkeiten anlegen
- [ ] c) Intensives Kirren zur Hauptschadenszeit (Vegetationszeit) im Feld, um Schaden zu verhindern

---

46.

Welche der nachgenannten Maßnahmen sind zur Reduzierung von Schwarzwildschäden geeignet?

- [X] a) Intensive Bejagung unter Nutzung aller zulässigen Jagdarten, insbesondere Durchführung von revierübergreifenden Bewegungsjagden und Sammelansitzen
- [X] b) Ganzjähriger Abschuss von Überläufern und vor allem Frischlingen bei jeder sich bietenden Gelegenheit, ohne Rücksicht auf deren körperliche Stärke
- [ ] c) Während der wildschadenskritischen Zeit bis zum Abernten der Felder verstärkte Schwarzwildbejagung innerhalb größerer Waldgebiete

---

47.

Bei welcher Witterung verspricht die Pirsch auf Schalenwild den besten Erfolg?

- [ ] a) Bei Hitze
- [X] b) Nach Regen
- [ ] c) Bei Wind

48.

Auf welche der nachgenannten Wildarten kann neben anderen Jagdarten das Buschieren mit Aussicht auf Erfolg angewandt werden?

- [ ] a) Baummarder
- [ ] b) Wildgänse
- [X] c) Fasan
- [X] d) Feldhase
- [ ] e) Ringeltaube

49.

Welche der nachgenannten Jagdstrategien gelten als geeignet, den Jagddruck auf Schalenwild zu vermindern?

- [ ] a) Häufiges Pirschen
- [ ] b) Häufige Einzelansitze
- [X] c) Intervalljagd
- [X] d) Einzelne Bewegungsjagden

50.

Was wird unter Schwerpunktbejagung beim Schalenwild verstanden?

- [ ] a) Erfüllung eines höheren Abschusses
- [ ] b) Beteiligung mehrer Jäger am Abschuss
- [X] c) Verstärkte Bejagung auf verbissgefährdeten Flächen

51.

Was wird unter Ausneuen verstanden?

- [ ] a) Das Aussetzen von Rebhühnern, um einen erloschenen Bestand erneut zu begründen
- [X] b) Das Ausgehen einer Marderspur unmittelbar nach nächtlichem Schneefall
- [ ] c) Das Anlegen eines neuen Pirschpfades

4.3.1.2 Lockjagd

52.

Bei der Lockjagd werden vom Jäger auch Lautäußerungen des Wildes und anderer Tiere nachgeahmt. Bei welchen der nachgenannten Wildarten sind es die Lautäußerungen des männlichen Wildes?

- [ ] a) Rehwild
- [ ] b) Fuchs
- [X] c) Rotwild
- [X] d) Gamswild

53.

Bei welcher der nachgenannten Wildarten wird bei der Lockjagd die Stimme des weiblichen Wildes nachgeahmt?

- [ ] a) Gamswild
- [X] b) Rehwild
- [ ] c) Hermelin
- [ ] d) Ringeltaube
- [ ] e) Fuchs

54.

Welche Laute werden üblicherweise vom Jäger in der Rehbrunft beim Blatten nachgeahmt?

- [X] a) Angstgeschrei der Geiß
- [X] b) Fiepton der Geiß
- [ ] c) Schrecken der Geiß
- [ ] d) Schrecken des Bockes

55.

Welche 2 Witterungsvoraussetzungen sind zur Blattjagd besonders günstig?

- [ ] a) kalt
- [X] b) heiß
- [ ] c) regnerisch
- [X] d) schwül
- [ ] e) windig

56.

Sie sitzen im Winter am Waldrand auf Fuchs an, führen eine Doppelflinte und haben Mauspfeife und Hasenquäke bei sich. Auf etwa 60 m schnürt auf der Wiese vor Ihnen ein Fuchs vorbei. Was ist am erfolgversprechendsten?

- [ ] a) Sofort auf den Fuchs schießen
- [X] b) Mit der Mauspfeife den Fuchs zum Erlegen heranlocken
- [ ] c) Mit der Hasenquäke den Fuchs zum Erlegen heranlocken

---

4.3.1.3 Gesellschaftsjagden

57.

Welche der nachgenannten Beschreibungen trifft auf ein Vorstehtreiben zu?

- [ ] a) Schützen und Treiber gehen in Form eines nach vorne offenen Rechteckes vor
- [X] b) Die Schützen verbleiben auf ihren Ständen und die Treiber treiben ihnen das Wild zu
- [ ] c) Jäger und Treiber bilden einen großen Kreis und rücken dann nach innen vor

---

58.

Welche der nachgenannten Kriterien kennzeichnen eine Drückjagd?

- [X] a) Sie wird auf Schalenwild angewendet
- [ ] b) Sie wird vornehmlich auf Hasen angewendet
- [ ] c) Viele Treiber gehen laut schreiend und klopfend durch die Dickung
- [X] d) Maximal 4 Treiber gehen ohne Lärm durch die Dickung

59.

Welche der nachgenannten Jagdarten können im Wald durchgeführt werden?

- [ ] a) Kesseltreiben
- [X] b) Vorstehtreiben
- [X] c) Drückjagd
- [X] d) Stöberjagd

60.

Welche der nachgenannten Jagdarten zählen zu den Feldtreibjagden?

- [ ] a) Buschieren
- [ ] b) Stöberjagd
- [X] c) Böhmische Streife
- [ ] d) Riegeljagd
- [X] e) Kesseltreiben

61.

Welche der nachgenannten Jagdarten wird als Böhmische Streife bezeichnet?

- [ ] a) Jäger und Treiber gehen einen großen Kreis aus und gehen nach dem Anblasen in Richtung Kreismitte
- [X] b) Jäger und Treiber gehen in Form eines nach vorne offenen Rechteckes vor
- [ ] c) Die Jäger verbleiben auf ihren Ständen und die Treiber drücken ihnen das Wild zu

---

62.

Wer muss sich bei Gesellschaftsjagden deutlich farblich von der Umgebung abheben?

- [X] a) Alle Beteiligten
- [ ] b) Nur die Treiber
- [ ] c) Nur Jagdleiter und Treiber

4.3.1.4 Auf bestimmte Wildarten bezogene Jagdarten

63.

Welche 2 der nachgenannten Möglichkeiten sind bei einer Gesellschaftsjagd auf den Fuchs am erfolgversprechendsten?

- [ ] a) Viele Treiber
- [X] b) Wenige Treiber
- [ ] c) Die Treiber gehen mit möglichst viel Geräusch
- [X] d) Die Treiber gehen langsam und leise

64.

Bei der Baujagd gelingt es dem Erdhund trotz langer Arbeit nicht, den im Bau bestätigten Fuchs zu sprengen. Welche Maßnahme ist geeignet, um den Fuchs im Anschluss an die erfolglose Bauarbeit ohne weiteren Einsatz des Hundes evtl. doch noch erlegen zu können?

- [X] a) Unmittelbar anschließender Anstand (Ansitz) am Bau
- [ ] b) Trampeln über dem Bau
- [ ] c) Abklopfen der Röhren

65.

Bei welchem Wetter ist die Baujagd auf Füchse am erfolgreichsten?

- [ ] a) Bei strengem Frost
- [X] b) Bei Wind und tropfendem Nassschnee
- [ ] c) Bei sonnigem Wetter

66.

Welche der nachgenannten Jagdarten wird speziell auf den Baummarder angewendet?

- [ ] a) Ansitz
- [X] b) Ausneuen
- [ ] c) Treibjagd
- [ ] d) Stöbern

67.

Welche der nachgenannten Jagdarten wird speziell auf den Steinmarder angewendet?

- [X] a) Ausklopfen aus Feldscheunen
- [ ] b) Treibjagd
- [X] c) Ansitz beim Mondschein an Kirrplätzen
- [ ] d) Drückjagd

68.

Was wird unter Frettieren verstanden?

- [ ] a) Pflegemaßnahmen einer Wildwiese
- [X] b) Baujagd mit Frettchen auf Wildkaninchen
- [ ] c) Die Verwendung von Netzen bei der Baujagd

69.

Welche Wildart kann unter Zuhilfenahme eines Frettchens bejagt werden?

- [ ] a) Füchse
- [X] b) Wildkaninchen
- [ ] c) Feldhasen

70.

Welche der nachgenannten Wildarten können durch Buschieren gezielt bejagt werden?

- [X] a) Feldhase
- [ ] b) Ringeltaube
- [ ] c) Hermelin
- [X] d) Wildkaninchen
- [X] e) Fasan

4.3.1.5 Fallenjagd

71.

Welche Jagdart auf den Waschbär ist am erfolgsversprechendsten?

- [ ] a) Ansitz
- [X] b) Fallenjagd
- [ ] c) Drückjagd
- [ ] d) Ausneuen

72.

Was ist ein Fangbunker?

- [X] a) Umzäunter, gegen menschliche Zugriffe abgesicherter Fangplatz
- [ ] b) Vorratsraum für Fallen und Köder
- [ ] c) Fangvorrichtung für den Lebendfang von Schwarzwild

4.3.2 Jagdausübung

4.3.2.1 Wildverhalten

73.

Welche Witterungsvoraussetzung ist für eine lebhafte Hirschbrunft am günstigsten?

- [ ] a) Warm bei bedecktem Himmel
- [X] b) Kalt bei klarem Himmel
- [ ] c) Dauerregen
- [ ] d) Starker Wind mit Regenböen

74.

Wodurch lassen sich im Juni Rehböcke bestätigen?

- [X] a) Plätzstellen
- [X] b) Fegestellen
- [ ] c) Schrecken
- [ ] d) Hexenringe

75.

Wodurch entstehen Hexenringe?

- [ ] a) Durch die Einstandsmarkierung des Rehbocks
- [X] b) Durch das Treiben des Rehwildes in der Brunft
- [ ] c) Durch das Rammeln des Feldhasen
- [ ] d) Durch die Bodenbalz des Auerhahns

76.

Bei einem Ansitz im Frühsommer beobachten Sie ein Stück Rehwild, das häufig hustet, niest und immer wieder das Haupt schüttelt. Worauf können Sie bei diesem Verhalten schließen?

- [ ] a) Verletzung des Hauptes infolge eines Zusammenstoßes mit einem Auto
- [X] b) Befall von Rachendasseln
- [ ] c) Folge einer starken Unterkühlung

4.3.2.2 Jagdausübungsregeln

77.

Wo werden bei einer Hasentreibjagd entlang einer Schneise in einer Dickung die Jäger abgestellt?

- [X] a) Auf der Seite, welche an das Treiben grenzt
- [ ] b) Auf der Gegenseite
- [ ] c) Auf der Schneisenmitte

4.3.2.3 Jagdausübung bis zum Schuss

78.

Welchem Zweck dient das Kreisen durch den Jäger?

- [X] a) Bestätigen des Wildes im Einstand
- [ ] b) Kontrolle der Reviergrenzen
- [ ] c) Auslaufen der Jäger beim Kesseltreiben

79.

Wodurch kann ziehendes Rehwild zum Verhoffen gebracht werden?

- [ ] a) Winken
- [ ] b) Angstgeschrei
- [X] c) Kurzes Anpfeifen
- [X] d) Fiepen

80.

Wodurch kann ein ziehendes Stück Rotwild zum Verhoffen gebracht werden?

[X] a) Mahnen

[ ] b) Winken

81.

Woran lässt sich im Juni bei einem weiblichen Stück Rehwild zweifelsfrei erkennen, ob es sich um eine <u>führende</u> Geiß handelt?

[ ] a) Am Haupt

[ ] b) An der Schürze

[X] c) Am Gesäuge

[ ] d) Am Haarwechsel

82.

An welchem Körpermerkmal können Sie im Juli bei einem allein äsenden Rottier zweifelsfrei erkennen, ob es sich um ein führendes Alttier oder um ein Schmaltier handelt?

[ ] a) Am Haarkleid

[X] b) Am Gesäuge

[ ] c) Am Wedel

83.

Bei welchen der nachgenannten Federwildarten kann Ende Oktober bei Tageslicht das männliche vom weiblichen Tier unterschieden werden, wenn es in Schussentfernung vorbeistreicht?

[X] a) Fasan

[ ] b) Graureiher

[ ] c) Graugans

[ ] d) Waldschnepfe

[X] e) Stockente

84.

Kann Ende November bei Büchsenlicht und guter Schussentfernung an einem einzelnen weiblichen Reh, das längere Zeit auf einer Wiese äst, eindeutig festgestellt werden, ob es sich um ein Schmalreh oder eine Geiß handelt?

[ ] a) Ja

[X] b) Nein

85.

An welchen der nachgenannten Merkmale lässt sich der Rehbock im Dezember sicher von der Rehgeiß unterscheiden?

- [X] a) Am Pinsel
- [X] b) Am Kurzwildbret
- [ ] c) An der Körpergröße
- [ ] d) Am Verhalten

86.

Ende November beobachten Sie neben einer Rehgeiß 2 männliche, nahezu gleich starke Rehe. Das eine hat nicht verfegte kleine Knöpfe und das andere verfegte kleine Spieße auf. Welches der beiden Rehe ist das im gleichen Jahr gesetzte Kitz?

- [ ] a) Das männliche Reh mit den verfegten Spießen
- [X] b) Das männliche Reh mit den nicht verfegten Knöpfen

87.

Im November haben Sie ein einzelnes Stück Gamswild auf eine Entfernung von 80 m vor sich, das Sie als alten Bock ansprechen. Welche 2 der nachgenannten Körpermerkmale können herangezogen werden, um sicher zu sein, einen Bock und nicht eine Geiß vor sich zu haben?

- [ ] a) Fehlen der Schürze
- [X] b) Herunterhängende Pinselhaare
- [X] c) Stark gehakelte Krucke
- [ ] d) Dunkelgraue Decke
- [ ] e) Hohe, weit gestellte Krucke

88.

Kann man bei Treibjagden im Oktober streichende Fasane in der Regel nach Hahn und Henne unterscheiden?

- [X] a) Ja
- [ ] b) Nein

89.

Ab wann können Sie auf der Jagd bei guten Lichtverhältnissen den Stockenten-Erpel am Gefieder von der Ente unterscheiden?

- [ ] a) Anfang September
- [X] b) Mitte Oktober
- [ ] c) Mitte November

90.

Ist ein zu Beginn der Jagdzeit fast fertig verfärbter Rehbock mit unverfegten lauscherhohen Spießen ein Jährling oder ein in der Geweihentwicklung zurückgebliebener älterer Bock?

- [X] a) Jährling
- [ ] b) Älterer Bock

91.

Eine alte Rehgeiß und ihr schwaches Kitz sind zu erlegen. In welcher Reihenfolge ist der Abschuss zu tätigen?

- [ ] a) Zuerst die Geiß, anschließend das Kitz
- [X] b) Zuerst das Kitz, anschließend die Geiß
- [ ] c) Beide zusammen, wenn sie genau hintereinander stehen, mit einem Schuss

---

92.

Welche Folge könnte der Schuss mit einer Büchse im Kaliber 5,6 x 52 R auf einen teilweise durch Gras verdeckten Rehbock haben?

- [ ] a) Der Bock geht bei dieser Deckungsmöglichkeit auch mit einem schlechten Schuss sofort ins Wundbett
- [X] b) Das Geschoss könnte abgelenkt werden
- [ ] c) Gras kann die Flugbahn eines Geschosses nicht verändern

---

93.

Welche der nachgenannten Schüsse gelten als nicht weidgerecht?

- [X] a) Büchsenschuss spitz von hinten auf ein äsendes Schmalreh auf eine Entfernung von 60 m
- [ ] b) Schrotschuss von hinten auf eine abstreichende Stockente bei einer Entfernung von etwa 25 m
- [X] c) Schrotschuss auf einen in 30 m Entfernung vorbeilaufenden, gesunden Fasanenhahn

---

94.

Beim Ansitz auf Rotwild im September hat ein Jäger einen Familienverband aus Alttier, Schmaltier und Kalb in einem Altholz vor sich. Kalb und Schmaltier stehen verdeckt hinter den Bäumen, nur das Alttier steht schussgerecht. Kann er in der Annahme, dass das dann verwaiste Kalb vom Schmaltier weiter geführt wird, das Alttier unbesorgt erlegen?

- [ ] a) Ja
- [X] b) Nein

4.3.2.4 Jagdausübung nach dem Schuss

95.

Welche der nachgenannten Organe können bei einem Blattschuss, den ein breitstehendes Stück Rehwild erhalten hat, durch den Geschoss<u>kern</u> getroffen sein?

- [ ] a) Pansen
- [X] b) Lunge
- [ ] c) Nieren
- [X] d) Herz
- [ ] e) Kleines Gescheide

96.

Welche der nachgenannten Organe können bei einem Weidwundschuss, den ein breitstehendes Stück Rotwild erhalten hat, durch den Geschosskern getroffen sein?

- [ ] a) Lunge
- [ ] b) Herz
- [X] c) Pansen
- [X] d) Gescheide

97.

Welcher der nachgenannten Körperteile ist bei einem Krellschuss getroffen worden?

- [ ] a) Vorderlaufknochen
- [ ] b) Unterkiefer
- [X] c) Ein Dornfortsatz der Wirbelsäule
- [ ] d) Brustspitze
- [ ] e) Kurzwildbrett

98.

Ein Rehbock schlägt beim Schuss mit den Hinterläufen nach hinten aus und trollt anschließend mit krummem Rücken der nächsten Dickung zu. Auf welchen Schuss deutet dieses Verhalten hin?

- [ ] a) Blattschuss
- [X] b) Weidwundschuss
- [ ] c) Laufschuss

99.

Ein Rehbock bricht auf den Schuss blitzartig zusammen, wird aber nach kurzer Zeit wieder hoch und flüchtet wie gesund. Um welchen Schuss handelt es sich?

- [ ] a) Blattschuss
- [X] b) Krellschuss
- [ ] c) Weidwundschuss

100.

Was bedeutet es, wenn sich ein beschossenes Stück Rotwild vom Rudel trennt?

- [X] a) Zeichen für eine schwere Schussverletzung
- [ ] b) Fehlschuss
- [ ] c) Streifschuss

101.

Welcher Treffer ist zu vermuten, wenn ein Stück Rehwild auf den Schuss steil nach oben steigt und dann in rasender Flucht mit tiefem Haupt in die nahe gelegene Dickung flüchtet?

- [ ] a) Trägerschuss
- [X] b) Blattschuss
- [ ] c) Leberschuss

102.

Wie zeichnet der Rehbock bei einem Vorderlaufschuss?

- [X] a) Er knickt vorn ein und schlenkert beim Flüchten meist mit dem getroffenen Lauf
- [ ] b) Der Bock zieht mit gekrümmtem Rücken weg
- [ ] c) Der Bock schlägt mit den Hinterläufen aus und stürmt davon

---

103.

Woran lässt sich erkennen, ob Federwild geständert ist?

- [ ] a) Am flügelschlagenden zu Boden gehen
- [X] b) Am sichtbar herabhängenden Ständer
- [ ] c) Am Himmeln

104.

Ein beim Abstreichen beschossener Fasanenhahn himmelt. Wo wurde er getroffen?

- [X] a) An der Lunge oder am Kopf
- [ ] b) An einem Ständer
- [ ] c) An einer Schwinge

105.

Welches der nachgenannten Schusszeichen deutet darauf hin, dass ein abstreichender Fasan weidwund getroffen wurde?

- [ ] a) Er fällt wie ein Stein herunter
- [X] b) Er streicht mit herunterhängenden Ständern weiter
- [ ] c) Er himmelt
- [ ] d) Er fällt trudelnd herunter

106.

Sie finden am Anschuss eines auf den Schuss hin geflüchteten Rehbockes hellroten, blasigen Schweiß. Was ist getroffen?

- [ ] a) Brustspitze
- [ ] b) Träger
- [X] c) Lunge
- [ ] d) Leber

107.

Ist es ein sicheres Zeichen für einen Fehlschuss, wenn am Anschuss eines Stückes Schalenwild weder Schweiß noch sonstige Pirschzeichen zu finden sind?

- [ ] a) Ja
- [X] b) Nein

108.

Welche Schussverletzung kann bei einem Stück Schalenwild vorliegen, wenn am Anschuss bräunlicher, körniger Schweiß gefunden wird?

- [ ] a) Lungenschuss
- [X] b) Leberschuss
- [ ] c) Herzschuss
- [ ] d) Wildbretschuss

109.

Vom Anschuss eines Rehbockes weg findet sich anfangs viel und dann immer weniger hellroter, blasenloser Schweiß, von dem nach etwa 100 m nur noch selten ein Tropfen zu finden ist. Welcher Schuss kann demzufolge vermutet werden?

- [ ] a) Leberschuss
- [ ] b) Herzschuss
- [ ] c) Lungenschuss
- [X] d) Wildbretschuss

110.

Wo ist eine Rehgeiß getroffen, wenn am Anschuss viel Schnitthaar und Hautfetzen zu finden sind?

- [ ] a) Weidwundschuss
- [X] b) Streifschuss
- [ ] c) Leberschuss

111.

Am Anschuss eines beschossenen und flüchtig abgegangenen Stückes Rehwild liegen Splitter von Röhrenknochen. Welcher Körperteil ist getroffen?

- [X] a) Lauf
- [ ] b) Brustspitze
- [ ] c) Wirbeldornfortsatz

112.

Welcher der nachgenannten Schüsse erfordert in der Regel die schwierigste Nachsuche?

- [ ] a) Leberschuss
- [ ] b) Lungenschuss
- [X] c) Vorderlaufschuss
- [ ] d) Pansenschuss

113.

Geht ein Stück Schalenwild nach einem Äserschuss nach kurzer Zeit ins Wundbett?

- [ ] a) Ja
- [X] b) Nein

114.

Bei einer Drückjagd wird von Ihnen ein Rotwildkalb beschossen. Es flüchtet in die angrenzende Dickung. Nach ¼ Stunde wird die Jagd abgeblasen. Wie verhalten Sie sich?

- [ ] a) Sie suchen in der Annahme, dass das Kalb tödlich getroffen ist, die Dickung in einem Umkreis von etwa 50 m in Fluchtrichtung ab
- [X] b) Sie verbrechen den Anschuss und melden den Vorgang dem Jagdleiter, wobei Sie sich gleichzeitig zur Nachsuche zur Verfügung stellen
- [ ] c) Sie holen Ihren abgelegten, auf der VGP erfolgreich geprüften Hund und beginnen die Nachsuche am langen Riemen

---

115.

Sie haben von einem Hochsitz aus einen Rehbock auf einer Wiese beschossen, der im Feuer schlagartig zusammengebrochen und im Gras liegend nicht mehr zu sehen ist. Was tun Sie?

- [X] a) Nachladen und mit schussfertiger Büchse mindestens 5 Minuten abwarten
- [ ] b) Entladen, Heruntersteigen, Nachladen und zum Anschuss laufen
- [ ] c) Heruntersteigen, Entladen und zum Anschuss gehen

116.

Beim Morgenansitz im Oktober ist ein Schmalreh beschossen worden, das mit krummem Rücken in eine 20 m entfernte Dickung getrollt ist. Es wird Weidwundschuss vermutet. Welche der nachgenannten Handlungsweisen ist vorzunehmen?

- [X] a) Nach etwa 2 Stunden den Anschuss suchen und an ihm den abgelegten Hund zur Nachsuche am Riemen ansetzen
- [ ] b) Unmittelbar nach dem Schuss den Anschuss suchen, verbrechen und nach 2 Stunden den Hund zur Nachsuche am Riemen ansetzen
- [ ] c) Unmittelbar nach dem Schuss den abgelegten Hund zur Verlorensuche schnallen

---

117.

Soll man einen geflügelten Fasan, der außerhalb des Treibens in ausreichender Schussentfernung davonläuft, beschießen?

[X] a) Ja

[ ] b) Nein

118.

Bei einer Waldtreibjagd rutscht ein von Ihnen krankgeschossener Hase in eine Bodenvertiefung, so dass Sie ihn nicht mehr sehen können. Wie verhalten Sie sich?

[ ] a) Sofort hinlaufen, um den Hasen zu töten

[ ] b) Nach Verständigung der beiden Nachbarschützen hinlaufen, um den Hasen zu töten

[X] c) Auf dem Stand verbleiben und nach Beendigung des Treibens mit einem brauchbaren Hund zur Anschussstelle gehen

---

119.

Dürfen Sie während einer Waldtreibjagd den Stand verlassen, um zu verhindern, dass der Vorstehhund eines anderen Schützen den von Ihnen erlegten Hasen ergreift und wegträgt?

[ ] a) Ja

[X] b) Nein

120.

Mit welcher der nachgenannten Handlungen sollten vom Hund apportierte, nicht verendete Hasen und Wildkaninchen sicher und tierschutzgerecht getötet werden?

[ ] a) Durch Fangschuss

[X] b) Durch Genickschlag

[ ] c) Durch Abnicken

121.

Mit welcher der nachgenannten Handlungen sollte vom Hund apportiertes noch nicht verendetes Federwild sicher und tierschutzgerecht getötet werden?

[ ] a) Durch Fangschuss

[ ] b) Durch Abfedern

[X] c) Durch Schlag auf den Kopf

122.

Soll auf eine geflügelte Ente, die auf das Wasser gefallen ist und der Deckung zustrebt, sofort noch mal geschossen oder sie der Verlorensuche des brauchbaren Hundes überlassen werden?

[X] a) Noch mal beschießen

[ ] b) Der Verlorensuche des Hundes überlassen

123.

Auf der Einzeljagd wird ein Hase krank geschossen. Wann soll die Verlorensuche mit einem brauchbaren Hund beginnen?

- [X] a) Sofort
- [ ] b) Nach 30 Minuten
- [ ] c) Nach 2 Stunden

4.4 Reviereinrichtungen

124.

Wozu dienen Pirschwege?

- [ ] a) Dem Vorbereiten eines Jägernotweges
- [X] b) Dem geräuschlosen Anpirschen
- [ ] c) Dem Raubwildfang in Fanggärten

125.

Welche der nachgenannten Holzarten ist gegen Vermorschen am widerstandsfähigsten, so dass sie sich zum Bau eines Hochsitzes am besten eignet?

- [ ] a) Birke
- [ ] b) Buche
- [X] c) Fichte

126.

Welche der nachgenannten Maßnahmen an Hochsitzen müssen Sie aus Gründen der Unfallverhütung während des gesamten Jahres beachten?

- [X] a) Die Überprüfung auf eingetretene Schäden vor jeder Benutzung
- [X] b) Den Abbau der nicht mehr benötigten Hochsitze
- [ ] c) Die Instandhaltung der Verblendung

4.5 Hege

4.5.1 Hege allgemein

127.

Von welcher der nachgenannten Wildarten werden Bruthütten oder Brutkörbe angenommen?

- [ ] a) Rebhühner
- [X] b) Stockenten
- [ ] c) Milane
- [ ] d) Graureiher

128.

Welche der nachgenannten Maßnahmen helfen, die Verluste an Rehkitzen durch Ausmähen zu verringern?

- [ ] a) Mähen in den frühen Morgenstunden
- [X] b) Wildrettergeräte an der Mähmaschine
- [X] c) Absuchen der Wiese mit dem Hund
- [X] d) Aufhängen von Scheuchen

129.

Welche der nachgenannten Tierarten können den Besatz an Bodenbrütern verringern?

- [ ] a) Bisam
- [X] b) Wanderratten
- [X] c) Dachs
- [X] d) Marder

130.

Welche der nachgenannten Wildarten können den Besatz an Hasen, Rebhühnern und Fasanen verringern und dürfen bejagt werden?

- [X] a) Hermelin
- [X] b) Iltis
- [ ] c) Rauhfußbussard
- [X] d) Steinmarder

131.

Welche der nachgenannten Tierarten erbeuten Entenküken im Wasser?

- [ ] a) Bisam
- [X] b) Wanderratte
- [X] c) Raubfische
- [ ] d) Biber

4.5.2 Nahrungsbedarf und natürliche Äsung

132.

Wann hat das Rotwild den höheren Nahrungsbedarf?

[X] a) Im Oktober/November

[ ] b) Im Januar/Februar

133.

Welche der nachgenannten Pflanzen sind als natürliche Winteräsung für Schalenwild besonders geeignet?

[ ] a) Weidenröschen

[ ] b) Erle

[X] c) Brombeere

[X] d) Heidelbeere

[X] e) Ginster

134.

In welchem der nachgenannten Monate ist der Nahrungsbedarf des Rehwildes am geringsten?

[X] a) Januar

[ ] b) Mai

[ ] c) September

135.

Welche der nachgenannten Pflanzen bietet dem Wild auch noch im Winter grüne Blattäsung?

[ ] a) Schwarzer Hollunder

[X] b) Brombeere

[ ] c) Haselnuss

[ ] d) Trauben-(Hirsch-)hollunder

[ ] e) Himbeere

4.5.3 Verbesserung der Lebensgrundlagen des Wildes

4.5.3.1 Verbesserung der Lebensgrundlagen allgemein

136.

Ein Jagdpächter will zusammen mit dem Grundstückseigentümer eine Streuobstwiese pflanzen. Muss dabei ein bestimmter Mindestabstand vom Nachbargrundstück eingehalten werden?

[X] a) Ja

[ ] b) Nein

137.

Wann dürfen Rohr- und Schilfbestände gemäht werden?

[X] a) 1. Oktober bis 28. Februar

[ ] b) 1. August bis 28. Februar

[ ] c) 1. September bis 31. März

138.

Welche Funktionen sollen sogenannte Pufferstreifen entlang von Hecken und Gewässern erfüllen?

[X] a) Nährstoff- und Pflanzenschutzmitteleinträge verhindern

[ ] b) Spaziergängern neue Wanderwege bieten

[X] c) Lebensräume für die Tierwelt schaffen

[ ] d) Den Landwirten zum Befahren mit ihren Maschinen dienen

---

139.

Welche der nachfolgend beschriebenen Vorgehensweisen entsprechen der gesetzlichen Pflicht zur Hege?

[X] a) Reduktion überhöhter Rehwildbestände zur Vermeidung übermäßiger Verbissschäden an der Waldverjüngung

[ ] b) Ausreichende winterliche Kraftfutterversorgung zur Erzeugung starker Trophäen bei Reh- und Rotwild

[X] c) Belassen von Stoppelfeldern zur Verbesserung des Winterlebensraumes von Rebhühnern

---

140.

Die Alp- bzw. Almwirtschaft verhindert durch die Beweidung ein Zuwachsen bzw. Verbuschen der Alp-/Almflächen. Welche Wildarten werden dadurch in ihren Lebensraumansprüchen <u>besonders</u> begünstigt?

[X] a) Rotwild

[X] b) Birkwild

[ ] c) Haselwild

[ ] d) Auerwild

141.

Welche Möglichkeiten der Reviergestaltung tragen zur Verbesserung der Äsungsmöglichkeiten für das Schalenwild bei?

[X] a) Anlage von Wildäckern

[X] b) Pflanzung von Hecken

[ ] c) Anlage von Tümpeln

[X] d) Anpflanzung von Wildobst

142.

Welchen Wildarten kommt die Stoppelbrache zugute?

- [ ] a) Baummarder
- [ ] b) Birkwild
- [X] c) Feldhase
- [X] d) Rebhuhn

4.5.3.2 Verbesserung von Deckung und Äsung

143.

Welche der nachgenannten Pflanzenarten sind für eine <u>einjährige</u> Wildackeransaat geeignet?

- [X] a) Buchweizen
- [ ] b) Topinambur
- [X] c) Sonnenblumen
- [ ] d) Waldstaudenroggen

144.

Auf welchen der nachgenannten Flächen ist die Anlage von Wildäckern nicht zulässig?

- [ ] a) Mehrjährig stillgelegte Ackerfläche
- [X] b) Magerrasen
- [X] c) Feuchtwiese

145.

Sie planen die Anlage von Wildäckern in der Feldflur. Welche der nachgenannten Pflanzenarten eignen sich besonders zur Schaffung von Deckung im Winter?

- [X] a) Sonnenblume
- [X] b) Ackersenf
- [ ] c) Phacelia
- [ ] d) Rotklee

146.

Welche der nachgenannten Kulturpflanzen eignen sich zur Aussaat auf Wildäckern für die Herbst- und Winteräsung des Rehwilds?

- [ ] a) Sommergerste
- [X] b) Rübsen
- [X] c) Raps

147.

Welche der nachgenannten landwirtschaftlichen Kulturpflanzen eignen sich für den Anbau auf Wildäckern zur Herbst- und Winteräsung von Rehwild?

- [X] a) Ölrettich
- [X] b) Raps
- [ ] c) Phacelia
- [ ] d) Hopfen

148.

Welche der nachgenannten Pflanzenarten sind für die Anlage eines Wildackers für Schalenwild besonders gut geeignet?

- [ ] a) Phacelia
- [X] b) Raps
- [X] c) Klee
- [ ] d) Sonnenblumen

149.

Welche Pflanzen bieten auf dem Wildacker auch noch im Winter bei längeren Frostperioden saftige Grünäsung?

- [X] a) Rübsen
- [X] b) Raps
- [ ] c) Süßlupine
- [ ] d) Sommergerste
- [X] e) Markstammkohl
- [ ] f) Buchweizen

150.

Welche Pflanzen bieten auf dem Wildacker auch noch im Winter bei längeren Frostperioden saftige Grünäsung?

- [ ] a) Ackersenf
- [ ] b) Mais
- [X] c) Markstammkohl
- [ ] d) Sonnenblumen
- [X] e) Raps
- [ ] f) Buchweizen

151.

Welche der nachgenannten Wildackerpflanzen bietet dem Schalenwild sowohl Blattäsung als auch Knollenäsung?

- [ ] a) Waldstaudenroggen
- [X] b) Topinambur
- [ ] c) Süßlupine

152.

Welche der nachgenannten Pflanzen sind mehrjährig und damit für Daueräsungsflächen geeignet?

- [ ] a) Hafer
- [ ] b) Mais
- [X] c) Dauerlupine
- [X] d) Topinambur
- [ ] e) Felderbse

153.

Welche der nachgenannten Pflanzen braucht bis zum Ausreifen 2 Jahre?

- [ ] a) Felderbse
- [ ] b) Süßlupine
- [ ] c) Sonnenblume
- [ ] d) Hafer
- [X] e) Waldstaudenroggen
- [ ] f) Alexandrinerklee

154.

Welche Wildackerpflanze bietet dem Schalenwild Blatt- und Knollenäsung?

- [ ] a) Sonnenblume
- [ ] b) Alexandrinerklee
- [X] c) Topinambur
- [ ] d) Rübsen

155.

Welche der nachgenannten Pflanzen sind mehrjährig und damit für Daueräsungsflächen geeignet?

- [ ] a) Ackerbohne
- [X] b) Topinambur
- [X] c) Weißklee
- [ ] d) Süßlupine
- [ ] e) Hafer

156.

Welches vorrangige Ziel soll durch die Anlage von mehrjährigen Wildäckern, Hecken und Feldgehölzen erreicht werden?

- [ ] a) Erhöhung der Wilddichte
- [ ] b) Verbesserung der Abschussmöglichkeiten im Feld
- [X] c) Verbesserung der Äsungs- und Deckungsverhältnisse im Feld

---

157.

Welche Gründe sprechen für die Anlage von Hecken und Feldgehölzen?

- [X] a) Schutz vor Beutegreifern für Niederwild und Vögel
- [X] b) Einstandsmöglichkeiten
- [X] c) Äsung
- [X] d) Brut- und Setzgelegenheiten
- [ ] e) Ablenkfutter für Schwarzwild

158.

Welche Bäume oder Sträucher eignen sich zur Anlage von Hecken in der Feldflur?

- [X] a) Schwarzdorn
- [X] b) Pfaffenhütchen
- [ ] c) Douglasie
- [X] d) Schneeball
- [ ] e) Weißtanne

159.

Welche der nachgenannten Gehölze zählen zu den Sträuchern?

- [ ] a) Feldahorn
- [X] b) Wildrose
- [X] c) Wolliger Schneeball
- [X] d) Kreuzdorn
- [X] e) Weißdorn
- [ ] f) Hainbuche

160.

Welche der nachgenannten Gehölze zählen zu den Sträuchern?

- [ ] a) Vogelbeere
- [X] b) Schlehe
- [ ] c) Vogelkirsche
- [X] d) Rote Heckenkirsche
- [X] e) Frühblühende Traubenkirsche
- [ ] f) Silberweide
- [ ] g) Zitterpappel/Espe/Aspe

161.

Welche der nachgenannten Gehölzarten eignen sich – sowohl im Hinblick auf ihre Standortansprüche als auch im Hinblick auf ihre Bedeutung als Wildäsung – besonders gut für die Bepflanzung ausgebeuteter, trockener und nährstoffarmer Kiesgruben?

- [X] a) Ginster
- [ ] b) Fichte
- [X] c) Sanddorn
- [ ] d) Bergahorn
- [ ] e) Rotbuche
- [X] f) Wildrose
- [ ] g) Weißtanne

162.

Was ist Proßholz?

- [ ] a) Gipfel frisch gefällter Fichten
- [ ] b) Mehrjährige Gräser (Stauden) mit verholztem Stängel
- [X] c) Abgeschnittene Zweige von Laubgehölzen, die zum Abäsen liegen bleiben

---

163.

Welche 2 Baumarten liefern als Proßholz dem Wild gute Äsung?

- [ ] a) Rotfichte
- [X] b) Obstbäume
- [X] c) Esche

164.

Für die Randbepflanzung von Feldhecken sind Sträucher mit Dornen oder Stacheln besonders günstig. Welche der nachgenannten Straucharten tragen Dornen oder Stacheln?

- [ ] a) Hartriegel
- [ ] b) Liguster
- [X] c) Wildrose
- [ ] d) Pfaffenhütchen
- [X] e) Schlehe

165.

Wie kann die Regeneration von Hecken gefördert werden?

- [ ] a) Natürlich wachsen lassen
- [X] b) Abschnittsweise auf Stock setzen
- [ ] c) Abbrennen

166.

Welche der nachgenannten Pflanzen bietet dem Wild auch noch im Winter grüne Blattäsung?

- [ ] a) Holunder
- [ ] b) Himbeere
- [X] c) Brombeere

4.5.4 Nahrungsergänzung

4.5.4.1 Salzlecken

167.

Welche der nachgenannten Wildarten nehmen Salzlecken an?

- [X] a) Rotwild
- [X] b) Rehwild
- [ ] c) Marder
- [X] d) Wildtauben
- [ ] e) Fasanen
- [X] f) Schwarzwild

4.5.4.2 Schalenwildfütterung

168.

Kraft-, Saft- und Rauhfutter werden unterschieden. Welche der nachgenannten Futterarten gehören zum Kraftfutter?

- [X] a) Eicheln
- [ ] b) Maissilage
- [ ] c) Gehaltsrüben
- [X] d) Getrocknete Zuckerrübenschnitzel
- [ ] e) Heu
- [X] f) Kastanien
- [X] g) Hafer

169.

Für die Schalenwildfütterung wird Rauh-, Saft- und Kraftfutter verwendet. Welche der nachgenannten Futtermittel gehören zum Saftfutter?

- [X] a) Rüben
- [ ] b) Kastanien
- [ ] c) Ölkuchen
- [ ] d) Eicheln
- [X] e) Maissilage
- [X] f) Apfeltrester

170.

In der Notzeit benötigt das Schalenwild vor allem Erhaltungsfutter. Welche der nachgenannten Futtermittel zählen hierzu?

- [ ] a) Maiskörner
- [X] b) Grummet
- [X] c) Futterrüben
- [X] d) Grassilage
- [ ] e) Kastanien
- [ ] f) Sojaschrot

4.5.4.3 Niederwildfütterung

171.

Welche der nachgenannten Futtermittel eignen sich für den Feldhasen?

- [X] a) Zweige von Obstbäumen
- [X] b) Rüben
- [ ] c) Fichtenzweige
- [X] d) Maiskolben

172.

Welche der nachgenannten Futtermittel eignen sich für Fasane?

- [ ] a) Knospen vom Obstbaumschnitt
- [X] b) Getreide
- [ ] c) Grassilage
- [X] d) Getreideabputz
- [X] e) Rosinen

173.

Welche der nachgenannten Örtlichkeiten eignet sich am besten für die Anlage einer Rebhuhnfütterung?

- [X] a) In einer Hecke im freien Feld
- [ ] b) In einem Feldgehölz mit hohen Bäumen
- [ ] c) Inmitten einer Fichtendickung

174.

Welche der nachgenannten Futtermittel sind für das Rebhuhn geeignet?

- [X] a) Getreideabputz
- [X] b) Wildkräutersamen
- [ ] c) Weichlaubholzzweige
- [ ] d) Grassilage

175.

Welche der nachgenannten Futtermittel eignen sich für die Fütterung von Wildenten?

- [X] a) Getreide
- [X] b) Eicheln
- [ ] c) Grassilage
- [ ] d) Rüben

176.

Wo werden Fasanenschütten angelegt?

- [X] a) Im Feldgehölz
- [ ] b) In der freien Feldflur
- [X] c) In Hecken

4.6 Wildkrankheiten

4.6.1 Kenntnis der Krankheiten

4.6.1.1 Kenntnis der Krankheiten allgemein

177.

Welche der nachgenannten Krankheiten führt beim Feldhasen zu großen Verlusten?

- [ ] a) Trichinose
- [X] b) Kokzidiose
- [ ] c) Myxomatose

178.

Wodurch wird beim Rehbock Perückenbildung ausgelöst?

- [ ] a) Laufverletzungen
- [X] b) Verletzung der Brunftkugeln
- [ ] c) Borelliose
- [ ] d) Vererbung

179.

Bei welcher der nachgenannten Gehörnabnormität kann der Rehbock sein Gehörn nicht mehr abwerfen?

- [ ] a) Korkenziehergehörn
- [ ] b) Mehrstangengehörn
- [X] c) Perückengehörn

180.

Welche der nachgenannten Krankheiten sind vom Wild oder durch Wildbret auf den Menschen übertragbar?

- [ ] a) Myxomatose
- [X] b) Trichinose
- [X] c) Tollwut
- [ ] d) Kokzidiose

181.

Welche der nachgenannten Aussagen zur Borelliose ist richtig?

- [X] a) Die Borelliose kann von Zecken auf den Menschen übertragen werden
- [ ] b) Gegen die Borelliose gibt es in Deutschland einen gut wirksamen Impfstoff
- [ ] c) Da die Borellioseerkrankung maximal nur die Symptome einer Grippeinfektion zeigt, ist sie keine beachtenswerte Erkrankung

---

4.6.1.2 Seuchen bei Wild- und Haustieren

182.

Welche Seuchen befallen sowohl das Schwarzwild als auch das Hausschwein?

- [X] a) Schweinepest
- [ ] b) Myxomatose
- [ ] c) Kokzidiose
- [X] d) Maul- und Klauenseuche

183.

Welche der nachgenannten Wildarten sind für Maul- und Klauenseuche empfänglich?

- [X] a) Rotwild
- [X] b) Rehwild
- [X] c) Muffelwild
- [X] d) Schwarzwild
- [ ] e) Luchs
- [ ] f) Hase

184.

Welche Körperteile werden bei der Trichinenschau untersucht?

- [ ] a) Proben aus dem Gehirn
- [X] b) Proben vom Zwerchfellpfeiler
- [ ] c) Proben aus dem Keulenmuskel

185.

Welche Körperteile müssen für eine Fleischuntersuchung in einem EU-zugelassenen Wildhandelsbetrieb bereitgehalten werden?

- [X] a) Der gesamte Wildkörper einschließlich Aufbruch
- [ ] b) Der gesamte Wildkörper ohne Aufbruch
- [ ] c) Eine Fleischprobe aus Zwerchfell und Bug von mindestens 100 g Fleisch

---

186.

Auf welche Innentemperatur ist Wildbret von Schalenwild nach dem Erlegen mindestens herunterzukühlen?

- [ ] a) 3°C
- [X] b) 7°C
- [ ] c) 11°C

187.

Ein Jäger möchte ein von ihm erlegtes Stück Rehwild in der Decke, das beim Aufbrechen keinerlei Veränderungen aufwies, an einen Gastwirt verkaufen.
Darf er dies ohne vorherige amtliche Untersuchung des Stückes tun?

- [X] a) Ja
- [ ] b) Nein

188.

Beim Aufbrechen eines Überläufers finden Sie rote Blutungspunkte auf dem Kehldeckel und in der Luftröhre. Für welche Krankheit ist dieser Befund typisch?

- [ ] a) Tollwut
- [X] b) Schweinepest
- [ ] c) Brucellose
- [ ] d) Räude

4.6.1.3 Parasiten

189.

Unter welchen der nachgenannten Parasiten hat Rehwild oft zu leiden?

- [X] a) Rachendasseln
- [ ] b) Räudemilben
- [X] c) Zecken
- [X] d) Lungenwürmern

190.

Bei welchen der nachgenannten Wildarten kann Räude seuchenhaftes Ausmaß annehmen?

- [ ] a) Rehwild
- [ ] b) Wildkaninchen
- [X] c) Fuchs
- [X] d) Gamswild
- [ ] e) Feldhase
- [ ] f) Muffelwild

191.

Welche Innenparasiten können das Rehwild befallen?

- [ ] a) Blutegel
- [X] b) Leberegel
- [ ] c) Trichinen
- [X] d) Lungenwürmer

192.

Bei welchen der nachgenannten Wildarten können sich Rachendasseln finden?

- [ ] a) Fuchs
- [X] b) Rehwild
- [ ] c) Schwarzwild
- [X] d) Rotwild

193.

Wie kommen die Larven der Hautdasselfliege in den Wildkörper?

- [ ] a) Sie werden mit der Äsung aufgenommen
- [ ] b) Sie werden von der Hautdasselfliege in den Windfang gespritzt
- [X] c) Sie bohren sich durch die Decke ein

194.

Wie wird die Kokzidiose bei Feldhasen und Wildkaninchen übertragen?

- [X] a) Durch Berührung mit Artgenossen
- [X] b) Durch die Losung
- [ ] c) Beim Schöpfen

195.

Welche der nachgenannten Wildarten sind häufig Trichinenträger?

- [X] a) Schwarzwild
- [ ] b) Rehwild
- [ ] c) Wildkaninchen
- [X] d) Fuchs
- [X] e) Dachs

196.

Welcher der nachgenannten Innenparasiten kommen während ihrer Entwicklung als Finnen im Zwischenwirt vor?

- [ ] a) Trichinen
- [ ] b) Spulwürmer
- [X] c) Bandwürmer

197.

Mit welchem der nachgenannten Innenparasiten des Fuchses kann sich auch der Mensch infizieren und daran lebensgefährlich erkranken?

- [X] a) Kleiner (fünfgliedriger) Fuchsbandwurm
- [ ] b) Räudemilbe
- [ ] c) Spulwurm

198.

Rehe leiden nicht selten unter einem Befall mit Rachendasseln (Rachenbremsenlarven). Welche der nachfolgenden Aussagen sind richtig?

- [X] a) Bei den Rachendasseln handelt es sich um das Larvenstadium einer Fliege
- [X] b) Die lebend gebärende Fliege schleudert im Vorbeiflug die Larven in den Windfang eines Rehes
- [ ] c) Die Eier werden mit der Äsung aufgenommen
- [ ] d) Die reifen Larven wandern durch den Körper des Rehes und verlassen es am Rücken nach Durchbohren der Haut

---

199.

Wie erfolgt beim Schalenwild die Ansteckung mit Magen- und Darmwürmern?

- [ ] a) Beim Abschlecken des Kitzes durch die Geiß
- [ ] b) Beim Beschlag
- [X] c) Durch Aufnahme von Larven mit der Äsung

200.

In welchem Teil des Körpers entwickeln sich im Zwischenwirt normalerweise die Finnen des Kleinen Fuchsbandwurmes?

- [X] a) Leber
- [ ] b) Zwerchfell
- [ ] c) Zunge
- [ ] d) Lunge
- [ ] e) Gehirn

4.6.1.4 Viruserkrankungen

201.

Welche der nachgenannten Tierarten gilt als Hauptüberträger der Tollwut?

- [ ] a) Dachs
- [ ] b) Schwarzwild
- [X] c) Fuchs
- [ ] d) Wildkaninchen

202.

Welche der nachgenannten Wildarten wird durch die Myxomatose befallen?

- [ ] a) Dachs
- [ ] b) Feldhase
- [X] c) Wildkaninchen
- [ ] d) Fasan

203.

Welche Altersklasse des Schwarzwildes hat die höchsten Verluste bei Ausbruch der Schweinepest?

[X] a) Frischlinge

[ ] b) Überläufer

[ ] c) Bachen und Keiler

204.

Welcher Körperteil des Fuchses wird zur mikroskopischen Untersuchung auf Tollwutbefall verwendet?

[ ] a) Leber

[X] b) Gehirn

[ ] c) Zwerchfell

205.

Welche der nachgenannten Krankheiten kann vorliegen, wenn beim Aufbrechen eines Stückes Schwarzwild Blutungen auf den Nieren und Lymphknoten sichtbar werden?

[ ] a) Trichinose

[ ] b) Tollwut

[X] c) Schweinepest

[ ] d) Maul- und Klauenseuche

4.6.2 Erkennen der Krankheiten

4.6.2.1 Parasiten

206.

Welche der nachgenannten Merkmale lassen beim Rehwild auf Befall mit Darmwürmern schließen?

[ ] a) Häufiges Husten

[X] b) Mit Losung verschmutzter Spiegel

[X] c) Verzögertes und schlechtes Verfärben

207.

Welche der nachgenannten Anzeichen an einem erlegten Gamsbock lassen vermuten, dass er von Räude befallen ist?

[ ] a) Blutungen auf den Organen

[ ] b) Löcher in der Decke

[X] d) Grauborkige Hautverdickungen mit Haarausfall

[X] e) Nackte Stellen am Kopf

208.

Zu welcher Zeit kann man beim Rehwild anhand von Lautäußerungen erkennen, ob ein Stück von Rachendasseln befallen ist?

[X] a) Mai/Juni

[ ] b) September/Oktober

4.6.3 Bekämpfen von Wildkrankheiten

209.

Unter den Wildkaninchen eines Reviers wird das Auftreten von Myxomatose beobachtet. Welche der nachgenannten Aussagen ist richtig?

[ ] a) Durch Impfen einzelner, zu diesem Zweck eingefangener Kaninchen wird die Weiterverbreitung der Seuche wirksam verhindert

[X] b) Durch sofortige scharfe Bejagung wird eine Verringerung des Kaninchenbesatzes erreicht und damit die weitere Ausbreitung der Seuche erschwert

[ ] c) Durch Einstellen der Jagd auf Kaninchen können die Verluste durch die Seuche ausgeglichen werden

---